

L'information diffusée via le réseau EWS est en premier lieu destinée à tous les professionnels du secteur socio-sanitaire qui entrent en contact avec des usagers de drogues. Cette information est destinée à être diffusée auprès de leur public d'usagers de drogues mais n'est pas destinée à une diffusion dans les médias.

EARLY WARNING SYSTEM - SYSTEME D'ALERTE PRECOCE

➤ Un décès suite à la consommation de fentanyl et de U-47700 et deux décès suite à l'usage détourné de fentanyl


Dans le cadre du système d'Alerte Précoce (Early Warning System – EWS), l'Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP) nous a informés de la survenue récente en Belgique de trois décès liés à la consommation de Fentanyl.

Premier cas

Un jeune homme a été retrouvé mort à son domicile en Flandre. L'autopsie et l'analyse de la poudre blanche trouvée à ses côtés ont mis en évidence que le décès était dû à la consommation de **fentanyl et de U-47700**. Il ne s'agissait pas d'un consommateur d'opiacés, mais il était connu pour être usager de nouvelles substances psychoactives. Il a manifestement acheté ces produits sur internet. L'enquête ne permet toutefois pas de savoir s'il a acheté cette poudre en l'état, ou s'il a effectué lui-même le mélange.

Deuxième et troisième cas

Deux jeunes hommes sont décédés en Flandre en janvier 2016 après avoir consommé des patches de fentanyl achetés illégalement et détournés de leur usage transdermique. Ces produits ont probablement été consommés par voie orale ou sublinguale.



Le **fentanyl** est un puissant analgésique, principalement prescrit sous forme de patches pour traiter des douleurs chroniques ou sévères, le plus souvent dans le cadre de soins palliatifs. Ses effets sont de 50 à 100 fois plus puissants que ceux de la morphine. Utilisé en combinaison avec de l'héroïne ou de la cocaïne, ou consommé en quantité excessive, le fentanyl peut provoquer des arythmies cardiaques, une dépression respiratoire, voire la mort.

Il est fortement déconseillé de consommer un patch entier de fentanyl par voie orale ou par injection, parce que cette dose est prévue pour s'administrer lentement en plusieurs jours. Si elle est consommée en une seule prise, il y a un risque important d'overdose.

Le **U-47700** est une nouvelle substance psychoactive de type opioïde. Sa puissance est de 7 à 8 fois plus élevée que celle de la morphine. Les effets de cette substance et les risques associés ne sont pas documentés dans la littérature scientifique, mais ils sont supposés être similaires à ceux des autres opiacés (dépression respiratoire, etc.). Les témoignages des usagers trouvés sur internet suggèrent qu'elle a des effets similaires à ceux de la morphine et de l'héroïne, mais de plus courte durée (60-90 minutes).

En cas d'overdose aux opiacés, l'administration de **naloxone** est fortement recommandée.

CONSEILS DE REDUCTION DES RISQUES POUR LES CONSOMMATEURS

1. Si vous achetez des produits psychoactifs sur Internet ou sur le Darknet, informez-vous de **la fiabilité du vendeur**. Les usagers ont la possibilité de laisser des commentaires sur la qualité et les effets du produit et la fiabilité du vendeur : prenez le temps de les parcourir, ils vous livreront des informations parfois précieuses. Néanmoins, vous n'aurez bien entendu aucune garantie sur la qualité ni sur la composition du produit. Soyez donc prudent !
2. **Veillez à ne jamais consommer seul ! Entourez-vous de gens qui peuvent vous aider en cas de problème.**
3. **Si vous décidez de consommer un produit, commencez si possible par une quantité inférieure à la dose habituelle** afin d'éviter les risques liés aux échantillons surdosés ou erronément labellisés. Vous aurez ainsi également l'occasion de vérifier comment votre organisme réagit à cette substance.
4. Si après une autre heure, vous ne sentez toujours pas les effets du produit, patientez avant d'augmenter la dose, car certaines substances actives se manifestent avec un effet retard (PMMA, DOB, etc.). De plus, certains produits peuvent contenir une autre substance active en quantité dangereuse (par exemple: PMMA, 4-FMP, 4-CMA). **Attention à la surdose!**
5. **Veillez à accorder le produit consommé avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez au moment de consommer.** Si certains produits sont festifs, d'autres gagnent à être consommés dans un environnement le plus familier et agréable possible. De même, consommez autant que possible quand vous vous sentez bien physiquement et mentalement.
6. **Évitez** autant que possible **les mélanges**, d'autant plus si vous n'êtes pas certain de la composition et des effets des produits que vous souhaitez consommer. Les effets, qu'ils soient déprimeurs, stimulants, hallucinogènes... peuvent se renforcer entre eux et augmenter les risques de bad trip ou de surdose. Dans le cas d'effets opposés, ceux-ci risquent au contraire d'être masqués et de vous faire croire que « rien » ne se passe, ce qui augmente très dangereusement le risque de surdoses. Un grand nombre des décès qui nous sont signalés impliquent de la polyconsommation !
7. Certaines substances traversent la barrière placentaire et passe dans le lait maternel. Il est donc fortement déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent. Quel que soit le produit, veillez à ne pas le laisser traîner à la portée des enfants.
8. Toutes les drogues entraînent une baisse de vigilance qui peut être à l'origine de relations sexuelles non-protégées et, parfois, non-désirées. Ayez toujours des préservatifs sur vous. Lorsque vous sortez avec un groupe d'amis, veillez les uns sur les autres.
9. Évitez toute activité exigeant de la concentration (travail sur des machines, conduite automobile ...): excitation, euphorie, nervosité, voire agressivité peuvent entraîner des conduites inadaptées ou une prise de risque inconsidérée.
10. Si vous n'êtes pas certains de la composition des produits achetés, n'hésitez pas à les faire **tester** !

❖ **En cas de malaise suite à une prise de comprimés ou à un mélange:**

- ✓ Appelez d'urgence les secours: formez le n°100 (numéro d'appel d'urgence en Belgique) ou le 112 (numéro d'appel d'urgence en Europe).
- ✓ Décrivez exactement ce que la personne a consommé: soyez rassuré, les équipes médicales travaillent dans la confidentialité et le respect du secret professionnel, sans risque de poursuites judiciaires.
- ✓ Décrivez l'état de la personne comme suit: est-elle consciente ou inconsciente? Respire-t-elle ou non? Son cœur bat-il ou non?

Pour toute question, appelez Infor-Drogues au 02/227.52.52 ou via l'e-permanence: <http://www.infordrogues.be> - toujours de manière anonyme) ou encore contactez Eurotox par e-mail info@eurotox.org